



PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

LISTA DE COMORBIDADES CONTEMPLADAS PARA 4ª DOSE DA VACINA CONTRA COVID-19

Público alvo: maiores de 18 anos com imunossupressão que já receberam três doses e que estejam contemplados na lista abaixo.

Data da aplicação da quarta dose: quatro meses após a dose de reforço (terceira dose)

- Imunodeficiência primária grave:
 - Deficiência de ADA
 - Deficiência de PNP
 - Deficiência de ZAP-70
 - Deficiência RAG-1, 2
 - Deficiência predominante de anticorpo
 - Agamaglobulinemia congênita
 - Hipogamaglobulinemia transitória da infância
 - Deficiência de subclasse de IgG
 - Deficiência seletiva de IgA
 - Imunodeficiência comum variável
 - Síndrome hiper-IgM
 - Síndrome de Wiskott-Aldrich
 - Ataxia-telangiectasia
 - Síndrome hiper-IgE
 - Doenças da desregulação do sistema imune
 - Síndrome Chediak-Higashi
 - Síndrome Griscelli
 - Poliendocrinopatia autoimune, com candidíase e distrofia ectodérmica (Apeced)
 - Desregulação autoimune, poliendocrinopatia e enteropatia ligada ao X (Ipex)
 - Defeitos congênitos dos fagócitos (número, função ou ambos)
 - Neutropenia congênita
 - Defeito na adesão leucocitária (LAD1 ou 2)
 - Doença granulomatosa crônica
 - Defeitos na imunidade inata
 - Candidíase mucocutânea crônica
 - Deficiência de MyD88
 - Doenças autoinflamatórias
 - Febre familiar do Mediterrâneo
 - Síndrome de Muckle-Wells
 - Urticária familiar ao frio
 - Síndrome neurológica cutânea e articular infantil crônica (Cinca)
 - Síndrome periódica associada ao receptor do fator de necrose tumoral
 - Micofenolato de Mofetila (Traps)
 - Síndrome febril periódica
 - Síndrome hiper-IgD
 - Deficiências do sistema complemento
 - Deficiência de C1q, r, s
 - Deficiência de C2-C9



PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

- Quimioterapia para câncer (estar fazendo tratamento com quimioterapia no momento)
- Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras (OBS: não está contemplado transplante de córnea) tais como:
 - Ciclofosfamida
 - Azatioprina
 - Ciclosporina
 - Micofenolato de Mofetila
- Pessoas vivendo com HIV/AIDS
- Uso de corticoides em doses maior ou igual a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais.

Tabela de Equivalência de Corticoides

Corticoide	Equivalente
PREDNISONA 10mg	Deflazacort 12mg
PREDNISONA 10mg	Prednisolona 10mg
PREDNISONA 10mg	Metilprednisolona 8mg
PREDNISONA 10mg	Dexametasona 1,6mg
PREDNISONA 10mg	Betametasona 1,2mg

- Uso de drogas modificadoras da resposta imune:
 - Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatioprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (infiximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).
- Doenças autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias:
 - Doença de Crohn, Retocolite Ulcerativa e Colites Indeterminadas
- Pacientes em hemodiálise.
- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (DRIM): artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico, polimiosite, dermatomiosite, esclerose sistêmica.